

予防接種スケジュール (3歳未満)

くん/ちゃん



年

月

日生

記入日

		チェック欄 <input checked="" type="checkbox"/>	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳	2 歳	3 歳
公費負担の 予防接種	三種混合I期 (DPT) 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	BCG 生ワクチン	<input type="checkbox"/>														
	ポリオ (経口) 生ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	麻疹・風疹混合 (MR) 生ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	日本脳炎 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
任意接種	肺炎球菌 (7価結合型) 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	Hib (インフルエンザ菌b型) 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	ロタ 生ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	B型肝炎 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
	水痘 (みずぼうそう) 生ワクチン	<input type="checkbox"/>														
	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎) 生ワクチン	<input type="checkbox"/>														
	インフルエンザ 不活化ワクチン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														

生ワクチン ……接種間隔は中27日  ……標準的な接種期間
 不活化ワクチン ……接種間隔は中6日  ……接種年齢



小児科/アレルギー科/子育て支援

パームこどもクリニック

〒520-3027 滋賀県栗東市野尻440
TEL.077-551-2110(代表)

予約専用ダイヤル: **077-551-2102**

2010年2月現在

ケータイから
予約もできます。




生後2ヶ月からの予防接種スケジュール（基本）

くん/ちゃん

年 月 日生

記入日



生ワクチン ... 接種間隔は中27日 標準的な接種期間

不活化ワクチン ... 接種間隔は中6日 接種年齢

1回目 2回目 3回目 ... 接種回数 1年以上 → ... 表示期間は接種を空けてください。



小児科/アレルギー科/子育て支援

パームこどもクリニック

〒520-3027 滋賀県栗東市野尻440

TEL.077-551-2110(代表)

予約専用ダイヤル: **077-551-2102**

2010年2月現在

ケータイから
予約もできます。



生後3ヶ月からの予防接種スケジュール

くん/ちゃん

年

月

日生

記入日

種類	年齢	チェック欄 ☑	3 か 月	1 歳
BCG 生ワクチン [公費負担]		<input type="checkbox"/>	1週間 → BCG	
三種混合I期(DPT) 不活化ワクチン [公費負担]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回目	4回目
Hib(インフルエンザ菌b型) 不活化ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回目	4回目
肺炎球菌(7価結合型) 不活化ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回目	4回目
ロタ 生ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回目	
B型肝炎 不活化ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回目	
麻疹・風疹混合(MR) 生ワクチン [公費負担]		<input type="checkbox"/>		MR
ポリオ(経口) 生ワクチン [公費負担]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1回目
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) 生ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/>		おたふく
水痘(みずぼうそう) 生ワクチン [任意接種]		<input type="checkbox"/>		水痘

接種可能になる月齢・年齢

- 生後2ヶ月 Hibワクチン・肺炎球菌ワクチン・ロタウィルスワクチン・B型肝炎ワクチン
- 生後3ヶ月 BCG・三種混合ワクチン・ポリオ
- 1歳 MRワクチン・おたふくかぜワクチン・水痘ワクチン

生ワクチン … 接種間隔は中27日

不活化ワクチン … 接種間隔は中6日

1回目 2回目 3回目 … 接種回数

1年以上 … 表示期間は接種を空けてください。



小児科/アレルギー科/子育て支援

パームこどもクリニック

〒520-3027 滋賀県栗東市野尻440

TEL.077-551-2110(代表)

予約専用ダイヤル: **077-551-2102**

2010年2月現在

ケータイから
予約もできます。



ワクチンで予防できる子どもの病気

三種混合(DPT)ワクチン

【ジフテリア】

のどについたジフテリア菌が増えて、炎症を起こす病気です。38度以上の熱と、犬の遠吠えのようなせきが特徴で、重症になると呼吸困難や神経麻痺、心筋炎を起こし死亡することもあります。

【百日せき】

連続したせきが長く続き、急に息を吸い込むので笛を吹くような音(ウープ)をとまなう呼吸困難、チアノーゼ、けいれん等が起こる病気です。乳児では無呼吸状態になることがあります。肺炎、脳炎を併発することがあります。

【破傷風】

土の中にいる破傷風菌が傷口から体に侵入し、菌の毒素でけいれんを起こす病気です。顔の筋肉が硬直して引きつったような表情になり、口が開かなくなることが特徴です。重症になると強いけいれんで呼吸ができなくなったりします。

BCGワクチン

【結核】

せきや発熱が続く病気ですが、子どもの場合、せきなどの症状はあまりみられません。赤ちゃんの場合は、粟粒結核や髄膜炎など重症になりやすく、後遺症が残ったり、死亡することもあります。

ポリオワクチン

【ポリオ】

小児麻痺とも呼ばれます。かかっても無症状か、かぜに似た症状だけですむ場合がほとんどですが、症状がでる場合は熱が下がった後に手足の麻痺があらわれます。

麻疹・風疹混合(MR)ワクチン

【麻疹 (はしか)】

熱、鼻水、せきなどの症状ではじまり、熱はいったん下がった後、上がります。特有の赤い発疹が顔から全身へ広がります。かかると肺炎や気管支炎、脳炎を合併することもあり、死亡する例もあります。

【風疹 (三日ばしか)】

発熱、赤い発疹、首のリンパ節のはれの3症状が特徴の病気です。熱がでないことも多くかぜに似た症状で、ふつうは3日程度で治ります。重症になると脳炎や血小板減少性紫斑病になることもあります。

日本脳炎ワクチン

【日本脳炎】

感染したブタから蚊がウイルスを運んできて感染し、脳炎を起こす病気です。ヒトからヒトへはうつりません。かかっても大多数は無症状ですが、脳炎になると高熱、けいれん、意識障害がでます。治療が難しく、死亡や重い後遺症の危険性があります。

肺炎球菌ワクチン

【肺炎球菌感染症】

肺炎球菌による病気で、脳を包む髄膜で炎症を起こす細菌性髄膜炎や菌血症、肺炎、中耳炎などを起こします。髄膜炎は早期診断が難しいため重症になりやすく、死亡や重い後遺症の残る例もあります。菌血症は髄膜炎の前段階となることがあります。肺炎や中耳炎は治りにくかったり、繰り返したりします。

ヒブワクチン

【Hib(インフルエンザ菌b型)感染症】

インフルエンザ菌b型という細菌(※インフルエンザウイルスとはまったく別のもの)による病気で、細菌性髄膜炎や喉頭蓋炎、肺炎などを起こします。5才までにかかることの多い病気です。髄膜炎は早期診断が難しく、重症化します。死亡や重い後遺症の残る例も多くあります。

ロタウイルスワクチン

【ロタウイルス胃腸炎】

ロタウイルス胃腸炎は激しい下痢やおう吐によって脱水を起こしやすく、けいれんがみられることもあるため、もっとも重症化しやすい乳幼児の胃腸炎と言われています。また、感染力が強く、衛生状態に気を付けるだけでは防ぎきることが難しい感染症です。

B型肝炎ワクチン

【B型肝炎ウイルス】

B型肝炎ウイルスが体に入ると肝炎をおこし、長く肝臓にすみついて(慢性化・キャリア化)、肝硬変や肝臓がんをおこします。非常に感染力が強いウイルスで、母親からの分娩時の感染(母子感染・垂直感染)や、原因が明らかな水平感染だけではなく、特に子どもの場合は、感染源が原因不明のことも多いとされます。

水痘ワクチン

【水痘(みずぼうそう)】

強いかゆみのある赤い水泡をともなった発疹が全身にできる病気です。発疹は水ぶくれ、かさぶたへと変化します。脳炎や肺炎、皮膚の細菌感染症などを合併することもあります。

おたふくかぜワクチン

【おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)】

発熱とともに片方または両方の唾液腺(※耳の下からあごにかけての部分)、特に耳下腺はれる病気です。ふつう1〜2週間で治りますが、無菌性髄膜炎や脳炎を合併することもあります。治らない難聴(片側)になったりします。

インフルエンザワクチン

【インフルエンザ】

悪寒や発熱、頭痛、関節痛などの全身症状がみられる病気です。赤ちゃんがかかると気管支炎や中耳炎、肺炎を合併することもあります。脳症を起こすと死亡や後遺症の危険性が高くなります。